

DUPONT
S A L S A[®] 7 5 D F
vízben diszpergálható granulátum (WG)

hatóanyag: 750 g/kg, (75 % m/m) etametszulfuron - metil

gyomirtó szer az őszi káposztarepce magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen

Kizárólag a DuPont-tól!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

A növényvédő szer gyártója:

DuPont International Operations S.a.r.l., 2, chemin du Pavillon, Le Grand Saconnex, Geneva, CH-1218 Svájc

Az engedély tulajdonosa és a készítmény forgalmazója: DuPont Magyarország Kft.

**2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
06/23-509-400**

Engedélyokirat száma: 04.2/3261-1/2013. (NÉBIH)

Forgalmi kategória: I.

Gyártási idő (hó/év) és szám: a dobozon található.

Eltarthatósági idő: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év

Nettó tartalom: 100 g

Gyermekektől elzárva tartandó.

Sürgős esetben hívható telefonszámok:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06-1-476-64-64 vagy ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-201-199 Budapest – **magyar 24 órán keresztül elérhető.**

E.I du Pont de Nemours & Co., USA – **angol: (1) 302-774-11-39**

A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai

Veszély jelek :



Figyelem

Tűzvesélyességi besorolás:

Nem jelölés köteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Kifejezetten veszélyes

Méhvesélyesség:

Nem jelölésköteles

p.o.LD₅₀ patkányon: > 2000 mg/ttkg

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági öveget!

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknél és kijuttatóknál: védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), védőkesztyű, védőlábbeli

(Zárt, túlnyomásos gépkabinban a kijuttatóknak nem szükséges.)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia:

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, azonnal orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Csomagolóanyag kezelés:

Tilos a csomagolóanyag bármilyen célú újra-felhasználása !

Vegye fel a kapcsolatot egy erre specializálódott és jogosítvánnyal rendelkező hulladék megsemmisítő vállalattal. **CSEBER Kht. 1024 Budapest Margit krt. 43-45. Tel: 1/340-48-88.**

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Dózis (g/ha)	Víz (l/ha)	A kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint)
őszi káposztarepce	magról kelő kétszikű gyomnövények	15-25	250-300	kultúrnövény 2-8 leveles állapota (BBCH 12-18)

Előírt növényvédelmi technológia:**A készítményből egy vegetációs időszakban maximum 25 g/ha juttatható ki!**

A készítményt az őszi káposztarepce kelése után posztemergensen kell kijuttatni ősszel vagy tavasszal a fagyok elmúltával, a repce 2-8 leveles fejlettségi állapotában, a magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles-4 valódi leveles állapotában. A legjobb hatást korai posztemergensen kijuttatva adja. A készítményt önmagában 20-25 g/ha dózisban kell felhasználni. Fejlettebb gyomnövények esetében a magasabb 25 g/ha-os dózis kijuttatása javasolt. A gyomok a hatóanyaggal szembeni rezisztenciájának kialakulása ellen javasolt az eltérő hatásmódú készítményekkel kombinálni azok engedélyezett dózisával. **A gyomirtó hatás fokozásának érdekében a permetléhez minden esetben Trend 90 hozzáadása szükséges 0,1 %-os koncentrációban.**

A készítmény kombinálható tankkeverékben a metazaklór, metazaklór + quinmerak és klopíralid + pikloram + aminopíralid hatóanyagú készítmények engedélyokiratban meghatározott dózisával. A kombinációban a készítményt 15-20 g/ha dózisban kell kijuttatni.

A készítmény egyszikű gyomnövények és árvakelésű gabona ellen tankkeverékben kombinálható az engedélyezett posztemergens egyszikűirtó készítményekkel, azok engedélyezett dózisával.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

A gyártó további hasznos tanácsai:

Hatásmechanizmus: A Salsa® 75 DF a levélen és a gyökéren keresztül hat az ALS enzim gátlása révén. A tipikus tünetek az érzékeny gyomokon (elszíneződés, nekrozis) a kezelést követően 3-10 nap múlva jelentkeznek. A meleg és nedves időjárási körülmények gyorsítják a száraz és hideg viszonyok késleltetik a tünetek kifejlődését.

Gyomspektrum***S A L S A® 75 D F**

gyomfaj		kód	a gyomfaj szí- 2 leveles állapotában
tudományos név	magyar név		
<i>Descurainia sophia</i>	sebforrasztó zsombor	DESSO	S
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	pásztortáska	CAPBP	S
<i>Matricaria inodora</i>	eb szíkfű	MATIN	S
<i>Sisymbrium officinale</i>	szapora zsombor	SSYOF	S
<i>Stellaria media</i>	tyúkhúr	STEME	S
<i>Thlaspi arvense</i>	mezei tarsóka	THLAR	S
<i>Sinapis arvensis</i>	vadrepce	SINAR	S
<i>Sonchus arvensis</i>	mezei csorbóka	SONAR	S
<i>Arabidopsis thaliana</i>	lúdfű	ARBTH	S
<i>Calepina irregularis</i>	matyó	CPAIR	S

<i>Galeopsis tetrahit</i>	tarka kenderkefű	GAETE	S
<i>Galinsoga parviflora</i>	gyakori gombvirág	GASPA	S
<i>Geranium dissectum</i>	sallangos gólyaorr	GERDI	S
<i>Geranium molle</i>	puha gólyaorr	GERMO	S
<i>Geranium pusillum</i>	apró gólyaorr	GERPU	S
<i>Geranium rotundifolium</i>	kereklevelű gólyaorr	GERRO	S
<i>Myosotis arvensis</i>	parlagi nefelejcs	MYOAR	S
<i>Raphanus raphanistrum</i>	repcsenyreték	RAPRA	MS
<i>Amaranthus retroflexus</i>	szőrös disznóparéj	AMARE	MS
<i>Chenopodium album</i>	fehér libatop	CHEAL	MS
<i>Lamium purpureum</i>	piros árvacsalán	LAMPU	MS
<i>Matricaria chamomilla</i>	orvosi szikfű	MATCH	MS
<i>Convolvulus arvensis</i>	apró szulák	CONAR	MS
<i>Veronica persica</i>	perzsa veronika	VERPE	MS
<i>Veronica hederifolia</i>	repkény veronika	VERHE	SP
<i>Centaurea cyanus</i>	kék búzavirág	CENCY	SP
<i>Fumaria officinalis</i>	orvosi füstike	FUMOF	SP
<i>Galium aparine</i>	ragadós galaj	GALAP	SP
<i>Papaver rhoeas</i>	pipacs	PARRH	SP
<i>Polygonum lapathifolium</i>	lapulevelű keserűfű	POLLA	SP
<i>Viola arvensis</i>	mezei árvácska	VIOAR	SP

S= érzékeny (>90%), MS = közepesen érzékeny (75-90%), SP= gyérítő hatás (<75%)

*A hatékonyság függ a gyomfajtól, annak fenológiai állapotától és a környezeti tényezőktől.

Kombinációs lehetőségek és keverhetőség:

Mindig tartsa be a kombinációs partner címkéjén található előírásokat.

A Salsa[®] 75 DF számos gyomirtó, gombaölő és rovarölő szerrel keverhető.

Tankkeverék készítésekor keverhetőségi próbát kell végezni.

A Salsa[®] 75 DF az alábbi hatóanyagok készítményeinek engedélyokiratban meghatározott dóziséval keverhető:

Gyomirtó szerek

metazaklór, metazaklór + quinmerak és klopíralid + pikloram + aminopíralid

Javasolt kombinációk kétszikű gyomnövények ellen:

Salsa 75 DF 15-20 g/ha+ 750-1000 g/l metazaklór hatóanyag +Trend 0,1 %

Salsa 75 DF 15-20 g/ha+ 832.5-999 g/l metazaklór+207.5-249 g/l quinmerak+Trend 0,1 %

Salsa 75 DF 15-20 g/ha+ 72g/l klopíralid+24 g/l pikloram+12 g/l aminopíralid+Trend 0,1 %

Javasolt kombinációk egyszikű gyomnövények és gabona árvakelés ellen:

propaquizafop 60-80 g aktív hatóanyag/ha,

ciklozidim, 75-100 g aktív hatóanyag/ha,

fluazifop-P-butil 60-375 g aktív hatóanyag/ha,

quizalofop-P-etil 20-30 g aktív hatóanyag/ha.

Engedélyezett dózis szerint. Tankkeverék készítés és használat esetén a tankkeverék partner címkéjén lévő ajánlás az irányadó!

Ha Salsa® 75 DF-et tankkeverékben használja egyszikű irtó készítménnyel és/vagy gombaölő és/vagy folyékony rovarölő szerrel, akkor a Trend 90 dózisa maximum 0.05 v/v % azaz 50 ml/100 liter permetlé !

Ha a Salsa® 75 DF-hez illetve Salsa®75 DF tankkeverékhez műtrágyát is ad, a Trend 90 dózisa maximum 0,05 v/v % azaz 50 ml/100 liter permetlé !

Fungicidek (legkorábbi fenológia BBCH 16)

tebukonazol, metkonazol, boszkalid, dimoxistrobin, difenokonazol, pikoxistrobin, ciprokonazol, **Acanto® Plus**

Rovarölő szerek

bifentrin, lambda-cihalotrin, ciflutrin, deltametrin, beta-ciflutrin, alfa-cipermetrin, indoxakarb, **Avaunt® 150 EC.**

Folyékony műtrágya

A permetléhez adott nitrogén műtrágya fokozza a **Salsa® 75 DF** és kombinációi hatékonyságát számos gyomnövényen, és elősegíti a permetlé levelekbe történő behatolását, különösen kedvezőtlen, száraz időjárási viszonyok mellett. Szintén segít a **Salsa® 75 DF** és a kétszikű gyomirtó készítmények között esetlegesen fellépő antagonizmus megakadályozásában. Javasolt dózis 28 %-os nitrogén oldat, mint pl. Nitrosol vagy UAN oldat 8-10 l/ha vagy szilárd jól oldódó és permetezhető műtrágya, mint pl. ammónium-szulfát, vagy ammónium-nitrát 3-4 kg/ha. A szilárd műtrágyákat előbb vízben oldja fel, majd állandó keverés mellett adja a permetléhez! A nitrogén műtrágyák nem pótolják a nedvesítőszer, ezért mindig nedvesítő szerrel (Trend™90) együtt használja a műtrágya adalékot! **Ha a Salsa® 75 DF-hez illetve Salsa® 75 DF tankkeverékhez műtrágyát is ad a Trend 90 Dózisa maximum 0,05 v/v % azaz 50 ml/100 liter permetlé !**

Konkrét esetekben forduljon a DuPont munkatársaihoz információkért.

Szelektivitás: az őszi káposztarepce toleráns a Salsa 75 DF-re, mivel a növény képes lebontani az etametszulfuron - metil hatóanyagot nem herbicid hatású metabolitokra. Ezzel szemben az érzékeny gyomfajok a hatóanyag lebontására nem képesek, mely feldúsul bennük és a pusztulásukat okozza.

Esőállóság:

A Salsa ® 75 DF a kezelést követő 3 óra múlva esőálló, de a kezelés után 2 órán belül lehulló csapadék csökkentheti a készítmény hatását.

Napraforgó árvelés gyomirtása őszi káposztarepcében:

A repcében feljövő árvelésű napraforgó gyomirtását nem ALS gátláson alapuló gyomirtó szerekre kell alapozni.

Újravetés növénykárosodás esetén:

1. Ha Salsa® 75 DF késő nyáron vagy ősszel lett kijuttatva őszi káposztarepcében:
Ha növény kipusztulás, károsodás stb. fordul elő a Salsa® 75 DF-el kezelt repcében a terület őszi búzával újravethető. Őszi árpával szintén újravethető, ha a kezeléstől már 45 nap eltelt. Az őszi árpa vetése előtt a talajt legalább 22 cm mélyen felszántani szükséges. Tavasszal tavaszi búza, tavaszi árpa, kukorica, Express®-toleráns napraforgó biztonsággal vethető.
Amennyiben a Salsa® 75 DF-et tankkeverékben vagy más gyomirtó szer után használja az utóvetemény esetében az egyéb készítmények előírásait is tartsa be a Salsa® 75 DF –re vonatkozó előírással együtt.
2. Amennyiben a Salsa® 75 DF tavasszal kerül kijuttatásra (március, április)
Napraforgó (Express®-toleráns hibrid is) biztonsággal vethető a talaj legalább 22 cm-es szántása után. Kukorica is vethető a kezelést követő 45 nap után és a talaj legalább 22 cm mélységű szántását követően.

Utóvetemény:

1. Ha a Salsa® 75 DF késő nyáron vagy ősszel lett kijuttatva, a repce betakarításának évében őszi árpa, őszi búza, borsó, kukorica vethető. A vetés előtt a talajt legalább 10 cm mélyen meg kell munkálni. A Salsa® 75 DF kezelés utáni második évben már bármely szántóföldi növény vethető. Amennyiben a Salsa® 75 DF-et tankkeverékben vagy más gyomirtó szer után használja az utóvetemény esetében az egyéb készítmények előírásait is tartsa be a Salsa® 75 DF-re vonatkozó előírással együtt.
2. Ha a Salsa® 75 DF tavasszal lett kijuttatva, a repce betakarításának évében őszi árpa, őszi búza, borsó, kukorica vethető. A vetés előtt a talajt legalább 22 cm mélyen meg kell munkálni. A Salsa® 75 DF kezelés utáni második évben már bármely szántóföldi növény vethető. Amennyiben a Salsa® 75 DF-et tankkeverékben vagy más gyomirtó szer után használja az utóvetemény esetében az egyéb készítmények előírásait is tartsa be a Salsa® 75 DF –re vonatkozó előírással együtt.
Zöldségnövények ültetése, vetése ill. gyümölcsös telepítése esetén kérje ki a DuPont szaktanácsát!

Permetlé elsodródás:

Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a permetlé ne sodródjon a kezelt területen kívülre, illetve folyóvizekbe, állóvizekbe, vagy csatornába.

Kerülje a permetlé szomszédos kultúrákra, ill. olyan területre sodródását, ahová érzékeny növényeket vetnek.

A nagyobb cseppméret csökkenti az elsodródás veszélyét, de nem szünteti meg, ha a kezelést nem megfelelően, vagy kedvezőtlen körülmények között végzik.

A magas hőmérséklet, szárazság, alacsony relatív páratartalom növeli az elsodródás veszélyét.

A permetezést irányító/végző személy felelős a permetezőgép megfelelő működéséért, pontos beállításáért és az elsodródás elkerüléséért.

Permetlé készítés:

A Salsa® 75 DF felhasználása előtt ellenőrizze a permetezőgép tisztaságát!

Az alábbi keverési eljárást kell alkalmazni:

- töltse a tartályt kb. 1/3-áig vízzel,
 - indítsa el a keverést,
 - adagolja a megfelelő mennyiségű Salsa® 75 DF-et közvetlenül a tartályba,
 - állandó keverés mellett töltse tele a tartályt,
 - ha a Salsa® 75 DF-et más szerekkel együtt, tankkeverékben használja, a kombinációs partnert a tele tartályba adagolja,
 - a TREND 90 nedvesítőszer mindig utoljára adja a keverékhez!
- Permetezés közben állandóan működtesse a keverőt!

Elcsorgás, kiszóródás, folyás esetén : *kerülje az érintkezést az anyaggal – ne nyelje le, tartsa távol gyúlékony anyagoktól – dohányozni tilos, használjon egyéni védőfelszerelést (kesztyűt, szemüveget stb.), akadályozza meg az anyag kiömlését – használjon abszorbens anyagot vagy porszívót az anyag felszedésére, tisztítsa meg a szennyezett környezetet nedves törülkövel, a tisztító anyagot és a szennyezett burkolatot zárható konténerbe helyezze, lépjen kapcsolatba a gyártóval, a szennyező anyagot a helyi ártalmatlanító vállalat előírása szerint kezelje !*

A permetezőgép tisztítása:

A permetezőgépet és szerelvényeit, a permetezést követően azonnal ki kell mosni, hogy elkerülje a repce után kezelendő növény károsodását!

Mindig viseljen védőruhát a permetezőgép tisztítása során, és ne végezze a mosást zárt helyen!

Javasolt módszer a permetezőgép tisztítására:

1. A permetezést követően azonnal ürítse ki a tartályt! A permetezőgépen lévő külső szennyeződéseket tiszta vízzel mossa le!
2. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel úgy, hogy mossa le a permetező tartály belső falait és a szűrőt. A mosó víz mennyisége a tartály térfogat legalább 20 %-a legyen. A mosó folyadékot permetezze ki a megfelelő területre.
3. Még egyszer öblítse át a permetező gépet tiszta vízzel a tartály térfogat 10 %-os mennyiségével.
4. A szórófejeket és a szűrőket elkülönítve kell tisztítani a mosó oldattal, majd tiszta vízzel le kell öblíteni!
5. Ha a **Salsa[®]75 DF**-re érzékeny kultúrák permetezésével folytatja a munkát (zöldségfélék, cukorrépa stb.), a 2-es pont után iktasson be egy mosószeres átmosást (szalmiákszesz, hipoklorid, trisó) és ezután a gépet tiszta vízzel teljesen feltöltve öblítse át. A permetezőgép tisztítása során használja az előírt védőfelszerelést. Ne végezze a tisztítást kutak és víznyerő helyek közelében.
A mosóvizet permetezze ki a területre.
Ha a **SALSA[®]75 DF** -et tankkeverékben használja más növényvédő szerrel, akkor mindig a tankkeverék partnerre vonatkozó eljárását alkalmazza a permetező tartály kimosásakor.

Korlátozások:

A Salsa[®] 75 DF csak mezőgazdasági termelésben használható !

A Salsa[®] 75 DF ugyanazon területen csak minden 3. évben használható !

Ne használja vízkultúrás és tápkockás termesztésben, valamint dísznövény kultúrákban.

A permetezőt használat előtt mindig kalibrálja be tiszta vízzel.

A permetező beállítását munka közben meghatározott időközönként ellenőrizze.

Törekedjen a készítmény pontos kimérésére és adagolására.

Csak annyi terméket keverjen be, amennyi a kezelni kívánt területre szükséges.

Kerülje el a tartály túltöltését és a permetlé elcsorgását.

A felesleges permetlevet ne öntse ki, a címke előírásainak megfelelő módon és dózisban permetezze ki.

Ne alkalmazza a SALSA[®] 75 DF-t olyan repcében amely stressz állapotba került szárazság, tápanyaghiány, szoloncsákos, szikes talajok, víznyomásos terület, növényi betegség vagy rovarkár miatt.

Figyelmeztetés:

A SALSA[®] 75 DF kijuttatásakor a repce állomány 80%-a már kikelt állapotban legyen és érje el a BBCH12 fejlettséget (2 leveles). A kezelést követő kiadós esőzés látható növénykárosodást és terméseszkökenést okozhat. Gyenge növényi kondíció, szikleveles állapot előtti kezelés, homok talajok ill. alacsony szervesanyag (humusz) tartalmú talajok növelhetik a növénykárosodás előfordulását.

Rezisztencia:

Az azonos hatásmechanizmusú gyomirtó szerek több éven át, ugyanazon területen való felhasználása természetes szelekció útján rezisztens biotípusok kialakulásához vezethet, amelyek dominánssá válhatnak a területen.

A rezisztencia kialakulása, ill. kifejlődése elkerülhető vagy elodázható, eltérő hatásmechanizmusú készítmények egymást követő, vagy tankkeverékben való alkalmazásával.

Káposztarepcében az őszi vetés előtti kezelések esetén vagy a vetés után, de kelés előtti kezelések esetén használjon más nem ALS-gátló készítményt. Ősszel korai kelés utáni kezelésként a **Salsa[®] 75 DF**-et **tankkeverékben használja** nem ALS-gátló típusú herbicidekkel (azok engedélyezett dózisában). Ha kelés után ősszel a **Salsa[®] 75 DF**-et önmagában használja, akkor tavasszal kezelje a repcét nem ALS-gátló típusú herbiciddel (azok engedélyezett dózisában).

A Salsa[®] 75 DF készítményből egy vegetációs szezonban maximum 25 g/ha juttatható ki!

Integrált növényvédelmi technológia

A termék beilleszthető az integrált növényvédelmi technológiába, ami magába foglalja a preventív biológiai, agrotechnikai beavatkozásokat a korrekkt betegség és kártevő felismerést és megfigyelést, valamint az optimális időben végzett célzott kezelést, amikor a kártételi küszöb megkívánja.

Csomagolóanyag kezelés:

Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, vízfolyásokba, víztározókba, állóvizekbe juttatni !

A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosólevet a permetléhez adni. Az üres csomagolóanyagot - a magyar előírásoknak megfelelően - kell megsemmisíteni.

Tilos a csomagolóanyag bármilyen célú újra-felhasználása !

Raktározás:

A készítményt eredeti, zárt csomagolásban, jól szellőző, szabályos növényvédő szer raktárban tárolja. Védje fagyhatástól, magas hőmérséklettől, illetve közvetlen napsugárzástól.

Figyelmeztetés:

A **Salsa[®] 75 DF** készítményt csak ezen címkének megfelelően javasolt felhasználni.

A DuPont garantálja, hogy a termék normál felhasználási viszonyok között megfelel a címkén leírt céloknek. Fitotoxicitás, hatáscsökkenés vagy más, nem szándékolt eredmény bekövetkezhet olyan tényezők miatt, mint: időjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja, mely tényezők kívül esnek a DuPont kontrollján és felelősségén.

A DuPont nem vállal felelősséget semmilyen, a termék - a DuPont ajánlásaitól eltérő - felhasználásából következő kárért, vagy károsodásért.

Ez esetekben a felelősség a felhasználót terheli.

® az E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) bejegyzett márkaneve