

## DuPont™ Principal® Plus Gold gyomirtó szer kereskedelmi csomag

Komplett kukorica gyomirtó szer csomag, öt hatóanyaggal a kukorica tökéletes posztemergens gyommentesítésére, az összes fontos évelő és magról kelő, egy- és kétszikű gyomnövény irtására áru- és silókukoricában.



Hatóanyag	92 g/kg nikoszulfuron + 23 g/kg rimszulfuron+550 g/kg dikamba és 300 g/l petoxamid + 187,5 g/l terbutilazin
Hatóanyag mozgása a kezelt növényben	felszívódó
Kiszérelés	10 hektáros kereskedelmi csomag: 10x440 g <b>Principal® Plus</b> + 10l Successor* T + 5x0,5l Trend®
Munka eü. várakozási idő	0 nap
É.V.I.	nk
Forgalmi kategória	I.
Formuláció	vízoldható granulátum (WG) és vizes szuszpenzió-emulzió (SE)
Eltarthatóság	3 év
Engedélyezett kultúrák	kukorica (takarmány)
Károsítók ellen	magról kelő és évelő egyszikű gyomfajok, valamint magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények
Dózis	440 g/ha + 1 l/ha + 0,1%
Javasolt permetlé mennyisége	250–300 liter
Kezelések maximális száma	1 alkalom/év (2 alkalom: osztott kezelés esetén)
Kijuttatás időzítése	posztemergensen a kukorica 3–7 leveles fenológiai állapotában, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 leveles állapotában, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15–25 cm, a kétszikű gyomnövények 2–4 leveles állapotában, mezei acat: tőlevélrózsás állapotban
Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)	7 leveles állapot
Légi kijuttatás	nem engedélyezett
Kombinációs partner	nem szükséges
Nedvesítőszer adagolása	<b>Trend®</b> 0,1% a permetlé százalékában
Esőállóság	a kezelés után 4 órán belül lehulló csapadék csökkentheti a készítmény hatását
Vetésváltás	a kezelés után 90 nappal a legtöbb szántóföldi növény vethető
Kezelt terület újravetése	kukoricával
Korlátozások	Ne használja szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel tankkeverékben. A gyomirtás és a szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel történő állománypermetezés között minimum 7 napnak kell eltelnie.
Figyelmeztetés	A klórpírifoszszal illetve szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel a vetéskor, vagy előtte kezelt kukorica súlyosan károsodhat, ha kelés után 45 napon belül a készítménnyel gyomirtjuk. Ennek következtében bekövetkező kár vagy termésvesztés a termelő felelőssége.
Rezisztencia menedzsment	ALS-rezisztens fenyércirok jelenléte esetén a készítmény felhasználása önmagában nem javasolt. Ilyen területeken alkalmazzon vetésváltást és más hatásmechanizmusú készítménnyel védekezzen.

\*a Successor T a Cheminova A/S márkanéve

10 hektár kezelésére összeállított komplett kukorica gyomirtó szer kereskedelmi csomag, olyan hatóanyagokból összeállítva, melyek biztosítják a kukorica tökéletes posztemergens gyommentesítését az összes fontos évelő és magról kelő, egy- és kétszikű gyomnövény ellen áru- és silókukoricában.

A kukorica gyomirtó szer csomagban a **Principal® Plus** maximális dózisa hektáronként 1 liter Successor T\*-vel került kiegészítésre. Ez a teljes hatásspektrumú technológia lehetővé teszi a nehezen irtható (pl. csattanó maszlag), vagy a már túlfejtett gyomok elleni védekezést is. Az egyszikű gyomok 1–3 leveles, kétszikű gyomok 2–6 leveles állapotában javasolt a felhasználása.



### Miért érdemes a Principal® Plus Gold gyomirtó szer csomagot választani?

- mert a kukorica 7 leveles koráig kijuttatható,
- mert kedvező ár-érték arányú,
- mert a megkésített vagy rosszul sikerült alapgyomirtás kijavítására is alkalmas,
- mert teljes hatásspektrumú a kukoricában előforduló valamennyi gyomnövény ellen,
- mert gyors perzselő hatása látványos,
- mert egy permetezéssel a csapadékviszonyoktól függetlenül elvégezhető a kukorica sikeres gyomirtása, így csapadékos és száraz évben is megbízható eredményt ad,
- mert kiemelkedő hatékonyságú az egyszikűek ellen; úgymint fenyércirok, köles, muhar fajok és kakaslábfű.

## Érzékeny gyomnövények: Principal® Plus Gold

### Évelő egyszikűek

fenyércirok  
tarackbúza

### Egyéves egyszikűek

fakó muhar  
hélazab  
kakaslábfű  
köles fajok  
nagy széltippan  
olasz perje  
parlagi ecsetpázsit  
pirók ujjas muhar  
ragadós muhar  
zöld muhar

### Kétszikűek

apró szulák  
árvalelésű napraforgó  
boglárika félek  
csattanó maszlag  
csorbóka fajok  
disznóparéj fajok  
egyéves szélű  
fekete ebszóló  
gyakori gombvirág  
kányaszásza fajok  
keserűfű fajok\*

közönséges aggófű  
laboda fajok  
libatop félek  
lórom fajok  
mezei acat  
mezei menta  
mezei tarsóka  
orvosi füstike  
parlagfű  
páztortáska  
pipacs  
ragadós galaj  
repcsényretek  
selyemmályva  
sövényzsalák  
szerbtövis fajok  
szikfű fajok  
tarka kenderkefű  
tarló tisztesfű  
tyúkhúr  
vadrepce  
varjúmák

láboda fajok

mezei acat

mezei menta

mezei tarsóka

orvosi füstike

parlagfű

páztortáska

pipacs

ragadós galaj

repcsényretek

selyemmályva

sövényzsalák

szerbtövis fajok

szikfű fajok

tarka kenderkefű

tarló tisztesfű

tyúkhúr

vadrepce

varjúmák

\*csak a magról kelő fajok

Érzékeny (95–100%)

Közepesen érzékeny (85–95%)